

Automatique — Système commandé

Chapitre 2 : Systèmes dynamiques et stabilité

Olivier Cots (rédigé avec Joseph Gergaud)

18 septembre 2023

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

- 2.1. Introduction
- 2.2. Équations différentielles linéaires autonomes
 - 2.2.1. Approche élémentaire
 - 2.2.2. Exponentielle de matrice
 - 2.2.3. Solution du problème à valeur initiale
 - 2.2.4. Comportement asymptotique des solutions
- 2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre
- 2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes
 - 2.4.1. Définitions
 - 2.4.2. Existence et unicité des solutions
- 2.5. Stabilité des équilibres
 - 2.5.1. Définition
 - 2.5.2. Résultats
 - 2.5.3. Exemples et applications

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Nous allons étudier l'équation différentielle à condition initiale suivante :

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0.$$

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la stabilité des équilibres de l'équation différentielle.

Définition 2.1.1 – Point d'équilibre

On appelle point d'équilibre tout point x_e de \mathbb{R}^n qui vérifie $f(x_e) = 0$.

Remarque 2.1.1. Si $x_0 = x_e$ alors on a trivialement comme solution $x(t) = x_e$ pour tout t .

Question : L'équilibre est-il stable ou instable ? Lorsqu'on part proche de ce point d'équilibre, on s'en rapproche ou on s'en écarte ?

Exemple 2.1.1. Pour le pendule simple non contrôlé, le point $(0, 0)$ est un point d'équilibre stable, alors que $(\pi, 0)$ est un point d'équilibre instable.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

On s'intéresse ici à la solution du problème à valeur initiale

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad x(0) = x_0,$$

Les points d'équilibre sont les éléments de $\text{Ker } A$.

Si A est inversible, il n'y a qu'un seul point d'équilibre $x_e = 0$.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

On considère l'équation différentielle ordinaire linéaire scalaire

$$\dot{x}(t) = \lambda x(t), \quad x(0) = x_0,$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x(\cdot): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On sait que la solution de cette équation, qui est unique, est donnée par

$$x(t) = e^{\lambda t} x_0.$$

Cette solution est définie sur \mathbb{R} et on a le comportement asymptotique suivant :

- Si $\lambda < 0$ alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$;
- Si $\lambda = 0$ alors $x(t) = x_0$;
- Si $\lambda > 0$ alors $\begin{cases} \text{Si } x_0 < 0 \text{ alors } \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = -\infty; \\ \text{Si } x_0 = 0 \text{ alors } x(t) = 0; \\ \text{Si } x_0 > 0 \text{ alors } \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = +\infty. \end{cases}$

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Considérons l'espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$ muni d'une norme matricielle vérifiant $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ pour toutes matrices A et B . Notons $(\mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$ cet espace. Alors, cet espace est un espace de Banach et on peut montrer que la série $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$ est absolument convergente¹ puisque

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} < +\infty.$$

Définition 2.2.1 – Exponentielle de matrice

On appelle exponentielle de matrice l'application

$$\begin{aligned} \exp: \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ A &\longmapsto \exp(A) = e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}. \end{aligned}$$

1. Or dans un Banach, toute série absolument convergente est convergente, cf. Proposition 3.19.5, Wagschal, topologie et analyse fonctionnelle.

L'exponentielle de matrice

$$\exp(A) = e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

vérifie les propriétés suivantes.

Théorème 2.2.2

- i) $e^0 = I$
- ii) si $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ alors $\exp(A) = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$
- iii) si P est inversible on a $\exp(PAP^{-1}) = P \exp(A) P^{-1}$
- iv) si A et B sont deux matrices qui **commutent** alors $e^{A+B} = e^A e^B$
- v) pour tous α et β scalaires, $e^{(\alpha+\beta)A} = e^{\alpha A} e^{\beta A}$
- vi) pour toute matrice A , e^A est inversible et $(\exp(A))^{-1} = \exp(-A)$
- vii) pour toute matrice A , l'application $t \mapsto e^{tA}$ est C^∞ et

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$$

► i) $e^0 = I$: évident.

ii) évident.

iii) P inversible : $e^{PAP^{-1}} = \sum \frac{(PAP^{-1})^k}{k!} = \sum \frac{PA^kP^{-1}}{k!} = Pe^AP^{-1}$

iv) Si A, B commutent, alors²

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}.$$

Ainsi,³

$$e^A e^B = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} = e^{A+B}, \quad c_n = \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!}.$$

v) $e^{(\alpha+\beta)A} = e^{\alpha A} e^{\beta A}$ car αA et βA commutent.

vi) A et $-A$ commutent donc $e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^0 = I$. Ainsi, $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

vii) $\frac{d}{dt} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$: on dérive sous le signe somme.

2. Ceci est la formule du binôme de Newton.

3. c_n est donné par le produit de Cauchy.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Théorème 2.2.3

L'unique solution de

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad x(t_0) = x_0,$$

s'écrit

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0.$$

► Soit $y(\cdot)$ une solution. On pose $z(t) = e^{-(t-t_0)A}y(t)$. Alors, $z(t_0) = x_0$ et

$$\dot{z}(t) = -Az(t) + e^{-(t-t_0)A}\dot{y}(t) = -Ae^{-(t-t_0)A}y(t) + e^{-(t-t_0)A}Ay(t) = 0,$$

donc $z(\cdot)$ est constant et finalement $y(t) = e^{(t-t_0)A}x_0$. ■

■ **Remarque 2.2.1.** On peut fixer $t_0 = 0$.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Si nous considérons le cas du système différentiel

$$\dot{x}(t) = \Lambda x(t), \quad x(0) = x_0,$$

avec

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

La solution est alors

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} x_{0,1} \\ \vdots \\ e^{t\lambda_n} x_{0,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix} x_0 = e^{t\Lambda} x_0$$

Le comportement asymptotique est alors

- si tous les λ_i sont strictement négatifs alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0 = x_e$;
- si tous les λ_i sont négatifs ou nuls alors la solution est bornée quand $t \rightarrow +\infty$;
- si au moins un λ_i est strictement positif et que $x_{0,i} \neq 0$ alors $\|x(t)\| \rightarrow +\infty$, quand $t \rightarrow +\infty$.

Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

On note $P(X) = \det(XI_n - A)$ le polynôme caractéristique de A et $\text{Sp}(A)$ le spectre de A , i.e. l'ensemble des valeurs propres de A .

On introduit :

- la multiplicité algébrique m_λ de $\lambda \in \text{Sp}(A)$ est son ordre de multiplicité en tant que racine de $P(X)$;
- la multiplicité géométrique d_λ de $\lambda \in \text{Sp}(A)$ est la dimension du sous-espace propre associé $E_\lambda = \text{Ker}(\lambda I_n - A)$.

On rappelle qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable ssi $\forall \lambda \in \text{Sp}(A)$, $d_\lambda = m_\lambda$ et si $P(X)$ est scindé, i.e. de la forme $P(X) = \prod (X - \lambda)^{m_\lambda}$.

Exemple 2.2.1. Soit $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. On a $P(X) = (X - \lambda)^2$ donc $m_\lambda = 2$ mais

$$\text{Ker}(\lambda I_2 - A) = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donc $d_\lambda = 1$. Au final, A est non diagonalisable.

Supposons A diagonalisable dans \mathbb{R} . Alors $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ t.q.

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

avec $\Lambda \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice diagonale.

Posons $z(t) = P^{-1}x(t)$, alors $z(t)$ est solution de

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = P^{-1}\dot{x}(t) = P^{-1}P\Lambda P^{-1}x(t) = \Lambda z(t) \\ z(0) = P^{-1}x_0. \end{cases}$$

On a donc $z(t) = e^{t\Lambda}P^{-1}x_0$ et

$$x(t) = Pz(t) = (Pe^{t\Lambda}P^{-1})x_0.$$

Par suite le comportement asymptotique est caractérisé par les valeurs propres de la matrice A .

$$x(t) = (P e^{t\Lambda} P^{-1})x_0, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$




Figure 1 – (Gauche) $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$. (Milieu) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. (Droite) $\lambda_1 \lambda_2 < 0$.

Remarque 2.2.2. Si $x_0 \in \text{Ker}(\lambda_1 I_2 - A)$, alors $x(t) = e^{t\lambda_1} x_0 \in \text{Ker}(\lambda_1 I_2 - A)$.

Supposons A diagonalisable dans \mathbb{C} , mais non dans \mathbb{R} .

- Il existe alors une valeur propre $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$:

$$\exists P \in GL_2(\mathbb{R}), \quad \text{tel que } A = PBP^{-1} \quad \text{avec} \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

- Dans cette base le système $\dot{x}(t) = Ax(t)$ s'écrit $\dot{z}(t) = Bz(t)$.
- La solution en z est donc

$$z(t) = \exp(\alpha t) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} z_0 = \exp(\alpha t) R(-\beta t) z_0.$$

- Comportement asymptotique
 - Si $\alpha < 0$ alors $z(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$;
 - Si $\alpha = 0$ $z(t)$ est borné ;
 - Si $\alpha > 0$ et $z_0 \neq 0$ alors $\|z(t)\| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$.

$$x(t) = \exp(\alpha t) (PR(-\beta t)P^{-1})x_0, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$




Figure 2 – (Gauche) $\alpha < 0$. (Milieu) $\alpha = 0$. (Droite) $\alpha > 0$.

Supposons A non diagonalisable dans \mathbb{C} .

- L'unique valeur propre λ est réel et le sous espace propre est de dimension 1 et A est semblable à la matrice

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

- Dans cette base le système différentielle s'écrit $\dot{z}(t) = J z(t)$

$$J = \lambda I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda I + N.$$

- Les matrices commutent et la matrice $N^2 = 0$, donc

$$z(t) = e^{\lambda t} \left(I + \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) z_0.$$

- Une nouvelle fois donc, si $\lambda < 0$ alors $z(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$.

$$x(t) = e^{\lambda t} \left(P \left(I + \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) P^{-1} \right) x_0.$$





Figure 3 – (Gauche) $\lambda < 0$. (Milieu) $\lambda = 0$. (Droite) $\lambda > 0$.

L'objectif du TD1 est de comprendre / construire le diagramme suivant :

Poincaré Diagram: Classification of Phase Portraits in the $(\det A, \text{Tr } A)$ -plane



Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

- 2.1. Introduction
- 2.2. Équations différentielles linéaires autonomes
 - 2.2.1. Approche élémentaire
 - 2.2.2. Exponentielle de matrice
 - 2.2.3. Solution du problème à valeur initiale
 - 2.2.4. Comportement asymptotique des solutions
- 2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre
- 2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes
 - 2.4.1. Définitions
 - 2.4.2. Existence et unicité des solutions
- 2.5. Stabilité des équilibres
 - 2.5.1. Définition
 - 2.5.2. Résultats
 - 2.5.3. Exemples et applications

On s'intéresse maintenant aux équations différentielles linéaires à condition initiale de la forme

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + b(t) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases} \quad (1)$$

La matrice $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ est constante et la fonction $b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ est supposée de classe \mathcal{C}^k , $k \geq 0$. On ne considère pas le cas où A dépend du temps.

Remarque 2.3.1. On admet l'existence d'une solution unique.

Théorème 2.3.1

La solution du problème de Cauchy (1) (ou problème à valeur initiale) s'écrit

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}b(s) \, ds.$$

Vérifions que $x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}b(s)ds$ est solution de

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + b(t) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$$

- La condition initiale est vérifiée car :

$$x(t_0) = e^{(t_0-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^{t_0} e^{(t-s)A}b(s)ds = x_0.$$

- L'équation différentielle est elle aussi vérifiée car :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{d}{dt}(e^{(t-t_0)A})x_0 + \frac{d}{dt} \left(e^{tA} \int_{t_0}^t e^{-sA}b(s)ds \right) \\ &= Ae^{(t-t_0)A}x_0 + Ae^{tA} \int_{t_0}^t e^{-sA}b(s)ds + e^{tA}e^{-tA}b(t) \\ &= Ax(t) + b(t). \end{aligned}$$

Retrouvons la solution de $\dot{x}(t) = Ax(t) + b(t)$, $x(t_0) = x_0$.

On pose $x(t) = e^{(t-t_0)A}z(t)$ et on cherche $z(t)$. Tout d'abord,

- $x(t_0) = e^{(t_0-t_0)A}z(t_0) = z(t_0) = x_0$.
- $\dot{x}(t) = Ax(t) + e^{(t-t_0)A}\dot{z}(t)$.

On veut donc que $b(t) = e^{(t-t_0)A}\dot{z}(t)$, ou encore que $\dot{z}(t) = e^{(t_0-t)A}b(t)$.

Finalement

$$z(t) = x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t_0-s)A}b(s) \, ds,$$

d'où

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}z(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^t e^{(t-s)A}b(s) \, ds,$$

car $e^{(t-t_0)A}e^{(t_0-s)A} = e^{(t-s)A}$.

Cette méthode est ce que l'on appelle la méthode de la **variation de la constante**.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

On considère l'équation autonome (i.e. f ne dépend pas de t) :

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(t_0) = x_0,$$

où

$$\begin{aligned} f: \quad \Omega \in \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ x &\longmapsto f(x), \quad \Omega \text{ ouvert.} \end{aligned}$$

Définition 2.4.1

On suppose f continue. On appelle solution de (IVP) tout couple (I, x) , t.q. I intervalle ouvert de \mathbb{R} contenant t_0 et $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ dérivable en tout point et vérifiant

- $x(t) \in \Omega, \forall t \in I$;
- $\dot{x}(t) = f(x(t)), \forall t \in I$;
- $x(t_0) = x_0$.

Exemple 2.4.1. Considérons le système $\dot{x}(t) = x(t)^2$ sur \mathbb{R} .

- La fonction nulle est une solution définie sur tout \mathbb{R} .
- La fonction $x(t) = -\frac{1}{t}$ définit deux solutions resp. sur $] -\infty, 0[$ et $] 0, +\infty[$ avec $x_0 = \mp 1, t_0 = \pm 1$.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Définition 2.4.2 – Fonction localement lipschitzienne

L'application $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, Ω ouvert, est localement lipschitzienne par rapport à la variable x si et seulement si pour tout $x_0 \in \Omega$ il existe un voisinage $V \in \mathcal{V}(x_0)$ et une constante $k \geq 0$ tels que

$$\forall x_1 \in V, \quad \forall x_2 \in V, \quad \|f(x_1) - f(x_2)\| \leq k\|x_1 - x_2\|.$$

Proposition 2.4.3

Si f est différentiable par rapport à x et si l'application dérivée $f': \Omega \rightarrow L(\mathbb{R}^n)$ est continue alors f est localement lipschitzienne.

Théorème 2.4.4 – Théorème de Cauchy-Lipschitz

*Soit $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, Ω ouvert de \mathbb{R}^n , f **localement lipschitzienne** alors pour tout $x_0 \in \Omega$, il existe une unique solution (maximale) au problème de Cauchy*

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(t_0) = x_0.$$

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Définition 2.5.1 – Point d'équilibre

On appelle **point d'équilibre** tout point x_e de \mathbb{R}^n qui vérifie $f(x_e) = 0$.

Définition 2.5.2 – Stabilité

Nous dirons qu'un équilibre x_e est **stable** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\|x_0 - x_e\| < \delta \quad \text{et} \quad t > 0 \quad \Rightarrow \quad \|x(t, x_0) - x_e\| < \varepsilon.$$

Remarque 2.5.1. Toute solution proche de x_e stable en reste proche.

Définition 2.5.3 – Stabilité asymptotique

Nous dirons qu'un équilibre x_e est **asymptotiquement stable** (A.S.) si il est stable et si il existe un voisinage V de x_e tel que, pour tout $x_0 \in V$,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t, x_0) = x_e.$$

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications

Théorème 2.5.4

- L'origine est un *équilibre asymptotiquement stable* de $\dot{x}(t) = Ax(t)$ si et seulement si *toutes* les valeurs propres de A sont à *partie réelle strictement négative*.
- Si A a au moins *une* valeur propre à *partie réelle strictement positive*, alors l'origine *n'est pas un équilibre stable* de $\dot{x}(t) = Ax(t)$.

Théorème 2.5.5

L'origine est un *équilibre stable* de $\dot{x}(t) = Ax(t)$ ssi toutes les valeurs propres de A sont à *partie réelle négative ou nulle* et si pour toute valeur propre de *partie réelle nulle*, les *multiplicités algébrique et géométrique coïncident*.

Théorème 2.5.6

Soit x_e un point d'équilibre de $\dot{x}(t) = f(x(t))$. Si *toutes* les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont à *partie réelle strictement négative*, alors le point d'équilibre x_e est *asymptotiquement stable*.

Remarque 2.5.2. Cette condition n'est pas nécessaire dans le cas non linéaire.

Exemple 2.5.1. Considérons $\dot{x}(t) = f(x(t)) = -x^3(t)$. Alors, $x_e = 0$ est un point d'équilibre A.S. tel que $f'(x_e) = 0$, car pour $x_0 \neq 0$, on a :

$$x(t, x_0) = \frac{\text{sign}(x_0)}{\sqrt{2t + \frac{1}{x_0^2}}}.$$

Théorème 2.5.7

Si $f'(x_e)$ a au moins *une* valeur propre à *partie réelle strictement positive*, alors x_e *n'est pas un équilibre stable*.

Remarque 2.5.3. La réciproque est fausse.

Exemple 2.5.2. On considère les cas $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et $\dot{x}(t) = g(x(t))$ avec $x_e = (0, 0)$ et

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix}, \quad g(x) = \begin{pmatrix} x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix}.$$

Alors, x_e est A.S. pour $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et instable pour $\dot{x}(t) = g(x(t))$.

On a tout d'abord

$$f'(x_e) = g'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Ainsi, $P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \lambda^2 + 1$ donc $\lambda = \pm i$.

Remarque 2.5.4. $\text{Real}(\pm i) = 0$.

Soit $x(\cdot)$ une solution de $\dot{x} = f(x)$. On pose $\rho(t) = \|x(t)\|^2$ et on a alors $\rho'(t) = -2\rho(t)^2$. Pour $\dot{x} = g(x)$, on a $\rho'(t) = 2\rho(t)^2$. On peut alors conclure, cf. polycopié.

Définition 2.5.8

Un point d'équilibre est dit **hyperbolique** si toutes les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont à partie réelle non nulle.

Corollaire 2.5.9

Un point d'équilibre hyperbolique est soit asymptotiquement stable, soit non stable.

Remarque 2.5.5. Pour $n = 2$ on a en x_e un point d'équilibre :

- Si $\det(f'(x_e)) < 0$ ou ($\det(f'(x_e)) > 0$ et $\text{tr}(f'(x_e)) > 0$) alors x_e n'est pas stable.
- Si $\det(f'(x_e)) > 0$ et $\text{tr}(f'(x_e)) < 0$ alors x_e est A.S.

Cas linéaire : $\dot{x}(t) = Ax(t)$. On pose $x_e = 0$.

- x_e est un eq. A.S. ssi $\forall \lambda \in \text{Sp}(A) : \text{Re}(\lambda) < 0$;
- Si $\exists \lambda \in \text{Sp}(A)$ t.q. $\text{Re}(\lambda) > 0$ alors x_e est un eq. instable ;
- x_e est un eq. stable ssi $\forall \lambda \in \text{Sp}(A) : \text{Re}(\lambda) \leq 0$ et si $\forall \lambda \in \text{Sp}(A)$ t.q. $\text{Re}(\lambda) = 0$ on a $m_\lambda = d_\lambda$.

Cas non linéaire : $\dot{x}(t) = f(x(t))$. Soit x_e t.q. $f(x_e) = 0$ et $A = f'(x_e)$.

- Si $\forall \lambda \in \text{Sp}(A) : \text{Re}(\lambda) < 0$ alors x_e A.S. ;
- Si $\exists \lambda \in \text{Sp}(A)$ t.q. $\text{Re}(\lambda) > 0$ alors x_e est un eq. instable.

Cas hyperbolique : x_e eq. hyperbolique ssi $\forall \lambda \in \text{Sp}(A) : \text{Re}(\lambda) \neq 0$.

- Un point d'équilibre hyperbolique est soit A.S., soit instable.

Chapitre 2: Systèmes dynamiques et stabilité

2.1. Introduction

2.2. Équations différentielles linéaires autonomes

2.2.1. Approche élémentaire

2.2.2. Exponentielle de matrice

2.2.3. Solution du problème à valeur initiale

2.2.4. Comportement asymptotique des solutions

2.3. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.4. Équations différentielles non linéaires autonomes

2.4.1. Définitions

2.4.2. Existence et unicité des solutions

2.5. Stabilité des équilibres

2.5.1. Définition

2.5.2. Résultats

2.5.3. Exemples et applications





Figure 4 – Pendule simple.

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l} \sin(x_1(t)) \\ x_1(0) = x_{0,1} = \alpha_0 \\ x_2(0) = x_{0,2} = \dot{\alpha}_0 \end{cases}$$

La figure ci-dessous montre les trajectoires dans le plan de phase. On a un point d'équilibre stable, mais non asymptotiquement stable et deux points d'équilibre instables. En présence de frottements, le point d'équilibre stable devient alors un point d'équilibre asymptotiquement stable.



Pendule simple : $\dot{x}(t) = f(x(t)) = (x_2(t), -\frac{g}{l} \sin(x_1(t)))$.

On a

$$f'(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos(x_1) & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc en $x_e = (0, 0)$, on a

$$\begin{aligned} f'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow \det(f'(x_e)) > 0 \text{ et } \operatorname{tr}(f'(x_e)) = 0 \\ &\Rightarrow \text{on ne peut pas conclure.} \end{aligned}$$


En revanche, en $x_e = (\pi, 0)$, on a

$$\begin{aligned} f'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow \det(f'(x_e)) < 0 \text{ et } \operatorname{tr}(f'(x_e)) = 0 \\ &\Rightarrow x_e \text{ est instable.} \end{aligned}$$

L'énergie mécanique du pendule s'écrit $E(x_1, x_2) = T(x_2) + V(x_1)$, avec $T(x_2) = \frac{1}{2} m l^2 x_2^2 \geq 0$ l'énergie cinétique et $V(x_1) = -mgl \cos x_1$ l'énergie potentielle de pesanteur. On a :

$$\forall t : E(x(t)) = E(x(0)),$$

c-à-d l'énergie mécanique est conservée. On peut alors montrer que $(0, 0)$ est stable, cf. la figure ci-dessous :



Pendule simple amorti : $\dot{x}(t) = f(x(t)) = (x_2(t), -\frac{k}{m}x_2(t) - \frac{g}{l}\sin(x_1(t)))$.

En $x_e = (0, 0)$, on a

$$f'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{k}{m} \end{pmatrix} \Rightarrow \det(f'(x_e)) > 0 \text{ et } \operatorname{tr}(f'(x_e)) < 0$$

$$\Rightarrow x_e \text{ est A.S.}$$

On a de plus : $\Delta = \operatorname{tr}(f'(x_e))^2 - 4\det(f'(x_e)) = \frac{k^2}{m^2} - 4\frac{g}{l}$.

Ainsi :

- Si $\Delta > 0$, alors $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-\frac{k}{m} \pm \sqrt{\Delta}) < 0$: cas P1, Fig. 1, slide 19.
- Si $\Delta < 0$, alors $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-\frac{k}{m} \pm i\sqrt{|\Delta|}) = \alpha \pm i\beta$, $\alpha < 0$: cas P7, Fig. 2, slide 21.
- Si $\Delta = 0$, alors $\lambda = \lambda_{1,2} = -\frac{k}{2m} < 0$ et $\dim(\operatorname{Ker}(f'(x_e) - \lambda I_2)) = 1$: cas P11, Fig. 3, slide 23.

Question : Dans le cas du pendule simple amorti, a-t-on montré que pour $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$, $\dot{\alpha}_0 = 0$, le système allait converger vers l'équilibre A.S. $(0, 0)$?

Question : Dans le cas du pendule simple amorti, a-t-on montré que pour $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$, $\dot{\alpha}_0 = 0$, le système allait converger vers l'équilibre A.S. $(0, 0)$?

Réponse : Non, on ne l'a pas montré !

On a montré que $\exists \bar{\alpha}_0 > 0$, $\exists \dot{\bar{\alpha}}_0 > 0$ t.q.

$$\forall (\alpha_0, \dot{\alpha}_0) \in V_0 =]-\bar{\alpha}_0, \bar{\alpha}_0[\times]-\dot{\bar{\alpha}}_0, \dot{\bar{\alpha}}_0[\in \mathcal{V}(0, 0), (\alpha(t), \dot{\alpha}(t)) \rightarrow (0, 0),$$

avec $(\alpha(0), \dot{\alpha}(0)) = (\alpha_0, \dot{\alpha}_0)$. Mais on ne connaît pas $\bar{\alpha}_0$, $\dot{\bar{\alpha}}_0$! Pour aller plus loin, il faut utiliser la théorie de Lyapunov.

Attention : dans le cas non linéaire, la notion de stabilité est locale !